



Ordu Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi


AIDS EĞİTİMİ


Acquired Immune Deficiency Syndrome




AIDS Kazanılmış Bağışıklık
Yetmezliği Sendromu olarak
tanımlanan ve henüz tedavisi
olmayan bir hastalıklar
bütünüdür.

Etken HIV (Human
Immunodeficiency Virus)






Etken olan HIV vücuda girdikten sonra çoğalarak kişinin çeşitli hastalıklara ve kanserlere karşı direncini zayıflatır. Sonuçta AIDS ortaya çıkar ve kişi birden fazla hastalıkla aynı anda mücadeleyle başlar.



DÜNYA'DA AIDS

- ❧ Dünyada 40 milyon dan fazla insanın HIV virüsü ile yaşadığı tahmin edilmektedir.
- ❧ 2005 yılında 3 milyon insan AIDS'ten öldü.
- ❧ Ölenlerin 570.000'i 15 yaş altı.
- ❧ Her gün 14 bin kişiye bulaşmaktadır.
- ❧ 25 yılda 25 milyon insan AIDS nedeniyle ölmüştür.



• Dünyada dakikada 6 kişiye,
• Günde yaklaşık 8.000 kişiye
• AIDS bulaşmaktadır.

• 15 yaş altında 2.3 milyon vaka
bulunmaktadır.

• 15 yaş altı her yıl yaklaşık 70.000
kişi yeni vaka olarak tespit
edilmekte




TÜRKİYE'DE AIDS

01.01.2006 tarihli Sağlık Bakanlığı
Verilerine göre :

Vaka : 588

Taşıyıcı: 1666

Toplam :2254



Büyükşehirlerimize göre AIDS'li sayısı :

İstanbul	: 678
İzmir	: 198
Ankara	: 114
Antalya	: 59
Adana	: 43



*Ülkemizde 30-34 yaş grubu arasında yaygın olarak gözükmemektedir.

*AIDS li Kadın vaka sayısı, toplam vakaların 1/3'ü kadardır.

*AIDS vakalarının % 5'i Uyuşturucu bağımlısıdır

*Kan transfüzyonu bağlı bulaşma %0 2

*Enfekte doğan bebek sayısı 41'dir.



•Ülkemizde ilk AIDS vakası 1985 yılında tespit edildi.



HIV NASIL BULAŞIR



1-Cinsel yolla bulaş

- En önemli bulaş yoludur
- Bulaşma için HIV pozitif kişiyle yapılan tek bir cinsel temas yeterlidir
- Korunmasız cinsel temasta; virüsün enfekte erkekten kadına bulaşma riski,enfekte kadından erkeğe bulaşma riskinden fazladır
- Rektal ilişki ile bulaşma riski daha yüksek
- CYBH varlığı bulaşma riskini arttırır



2-Kan ve kan ürünleri ile bulaşma

-HIV yönünden tarama yapılmaya başlandığından beri bu yolla bulaşma azalmıştır

- Kan ve KÜ transfüzyonu
- Organ transplantasyonu



-Enjektör ve diğer aletlerle bulaşma

- Damar içi madde kullananlar önemli risk grubudur

-Sağlık personeline bulaşma

- İğne,enjektör batması ile(risk %0.2-0.5)
- İnfekte vücut sıvıları ile bulaşmış mukozal temasla (risk %0.1)

3-Anneden bebeęe bulařma

- Gebelik süresince
- Doęum sırasında (%10-30)
- Postpartum dönemde emzirmekle



HIV NASIL BULAŞMAZ

HIV günlük sosyal ilişkilerle geçmez...

- Cinsellik dışında yakın ilişkiyle
- Banyolardan
- Tuvaletten
- Yüzme havuzundan
- Duşlardan
- Telefonlardan
- Yiyecek-içecek paylaşılmasıyla
- Sinek ve böcek vektörlerle bulaşma gösterilememiştir




HIV gnlk yařamda;

- * Aynı odada,
- * Broda,
- * Sınıfta bulunmakla,
- * Aynı havayı solumakla

Bulařmaz!





BENİ BÖYLE
TERKEDEMEZSİN,
KARNIMDA ÇOCUĞUNU
TAŞIYORUM...

YUMURTLA O ZAMAN,
HAYRET Bİ ŞEY...

BELİRTİLER

- Ateş(%96)
- Yaygın LAP(%24)
- Farenjit(%70)
- Döküntü(%70)
- Myalji ve artralji(%54)
- Diyare(%32)
- Baş ağrısı(çoğunlukla retroorbital,%32)
- Bulantı ve kusma(%27)
- HSM(%14)
- Pamukçuk(%12)
- Nörolojik semptomlar(%12)



Ancak;
Bütün bu belirtiler basit bir
hastalık nedeni olabilir...
Kuşkulu iseniz, ELIZA Testi
Yaptırın




HIV virüsü ile enfekte kiři herhangi bir belirti göstermeyip saęlıklı görünebilir, fakat AIDS'i başkalarına bulaştırır.




KİMLER RİSK ALTINDA

AIDS virüsü taşıyan herhangi bir kişinin bu virüsü yayabileceğini hiçbir zaman unutmamalıyız. AIDS teşhisi konmuş hastalar birçok risk kategorisine mevcutturlar. Yapılan açıklamalar ve raporlarda AIDS bulaşma oranlarının kategorilere göre ayrımı aşağıdaki gibidir.



RISK DURUMU



KORUNMA YOLLARI



-Cinsel yolla bulaşmaya karşı korunma

- Genital ve oral mukoza membranlarının cinsel ilişki sırasında kan, semen, vajinal ve servikal sekresyonlarla temasının azaltılması
- Kondom kullanımının teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması
- Cinsel yolla bulaşan diğer hastalıkların tedavisi
- Güvenli cinsel temasın yaygınlaştırılması (tek eşli cinsel yaşam veya uygun ve güvenli cinsel eş seçimi)



-Kan ve kan ürünleriyle bulaşmaya karşı korunma

- Antikor testleri bulunduğundan beri bu yolla bulaş azalmıştır
- Damar içi madde kullananlarda
 - Bu alışkanlığın önlenmesi ve tedavi edilmesi
 - Ortak enjektör kullanım risklerinin anlatılması
 - Kondom kullanımının sağlanması
 - Steril enjektör kullanımının sağlanması
 - Eğitim



-Anneden bebeğe geçişe karşı korunma

- HIV pozitif kadına doğum kontrol yöntemleri öğretilmelidir
- Hamile kalan HIV pozitif kadına erken dönemde kürtaj yapılmalıdır
- Bebeği doğurmakta ısrarlı ise gebeliğin son trimesterinde anneye, doğumdan sonra da bebeğe antiretroviral tedavi başlanmalıdır
- Elektif sezaryan uygulanırsa bebeğe HIV geçişi 4-5 kat azalır
- Virüs anne sütü ile geçiş gösterildiğinden emzirme önerilmez

Cinsel yolla bulaşmayı önlemek için;

Şu gruplardan kişilerle cinsel ilişkide bulunmayın;

- *Homoseksüel ve biseksüel erkekler
- *Para karşılığı cinsel ilişki kuranlar
- *Birden fazla cinsel eşi olanlar
- *Uyuşturucu kullananlar

İşinizi şansa bırakmayın!!

Her tür cinsel ilişkide kondom kullanın!

AIDS TEHLİKELİDİR!..

AŞISI YOKTUR!..

TEDAVİ EDİLEMEZ!..

ÖLDÜRÜR!..

SINIR TANIMAZ,

IRK, YAŞ, CİNS AYRIMI YAPMAZ!..



DİKKAT!!!

- 1-Karşılıklı sadakate ve tek eşliliğe dayalı ilişkiler kurulmalıdır.
- 2-Cinsel ilişki sırasında mutlaka kondom (prezervatif-kaput) kullanılmalıdır.
- 3-HIV şüphesi varsa gebelikten önce mutlaka test yaptırılmalıdır.
- 4-Tıraş olurken berberiniz tek kullanımlık jilet kullanmalı;kan taşı asla kullanmamalıdır.
- 5-Manikür, pedikür yaptırırken, Kulak deldirirken, Diş muayene ve tedavilerinizde kullanılan aletlerin steril, enjektörlerin tek kullanımlık olmasına dikkat ediniz.



HIV TESTİ



AIDS virüsünün bulaşma ve hastalığın ortaya çıkması arasında 2-10 yıl süre geçmekte bazılarında ise hiç ortaya çıkmamaktadır. Virüsün varlığı HIV TESTİ denilen ve ELİSA yöntemi ile kanda vücudun virüse karşı oluşturduğu savunma cevabını ölçen test ile belirlenir.

Bu test kişilerin sağlık kuruluşlarına başvuruları sırasında yapılır.

ELİSA TEKNİĞİ OLAN HASTANE

Ordu Devlet,
Fatsa Devlet,
Ünye Devlet,
Özel Umut Hast.,
Doğum ve Çocuk Bakımevi




HIV-AIDS İLE İLİŞKİLİ MALIGNİTELER

- Kaposi sarkomu
- Hodgkin dışı lenfoma
- Hodgkin hastalığı
- Serviks kanseri
- Anal kanal kanseri
- Diğer neoplaziler
 - Cilt
 - Akciğer
 - GIS adenokarsinomları
 - Baş-boyun



FIRSATÇI ENFEKSİYONLAR

- Pneumocystis carinii enfeksiyonları
- Toxoplasma enfeksiyonları
- Atipik mikobakteri enfeksiyonu
 - %97 si *Mycobacterium avium complex* ile gelişir
- Virus enfeksiyonları
 - HSV —HZV —CMV
- Mantar enfeksiyonları
 - Candida*
 - Cryptococcus neoformans*
 - Histoplasma capsulatum*
 - Aspergillus*
 - Coccidioides immitis*



- İntestinal parazit enfeksiyonları
 - Isospora belli*
 - Cryptosporidium*
 - Microsporidia*
- Progresif multifokal lökoensefalopati
- Kutanöz lezyonlar
 - Perianal ve genital kondiloma akuminata
 - Seboreik dermatit
 - Folikülit
 - Psoriasis
 - Stafilakokal ve streptokokal ektima
 - Molloscum contagiosum
- Nörosifiliz




The Mouth



White coating on the tongue with bad odour due to fungal infection. Marks on the side of the tongue called leukoplakia. Cannot be removed.

Swollen Glands

These can occur in the neck , under the ear, in the armpits and in the groin or genital area.



The Skin

Ringworm (fungal) infection



Ringworm infection of the feet. Also known as athlete's feet.



The Skin

Kaposi's skin cancer. The spots may start of as a pink pimple and then grow in size. They become red, purple, brown and black.



The Mouth

Kaposi's cancer. Pink, purple, brown or black spots inside the mouth. Can be seen on the gums as well.



DANIřMA HATTI

AIDS'e KARřI KORUNUN !!!

AIDS HAKINDA BİLGİ ALIN !!!

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
ÜCRETSİZ DANIřMA HATTI
Tel:0.800.314.79.19 (10 hat)



İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ...