


Geometri Formülleri


ceBİRSEl.com

ÜÇGENDE AÇI ÖZELİKLERİ




1. Üçgenin iç açıları ölçüleri toplamı 180° dir.
 $x + y + z = 180^\circ$
2. Üçgenin dış açıları ölçüleri toplamı 360° dir.
 $x' + y' + z' = 360^\circ$
3. Bir dış açının ölçüsü kendisine komşu olmayan iki iç açının ölçüleri toplamına eşittir.
 $x' = y + z \quad y' = x + z \quad z' = x + y$
4. İki iç açıortayın kesişmesiyle oluşan açının ölçüsü

$$x = 90^\circ + \frac{m(\widehat{A})}{2} \quad (\widehat{BDC} : \text{geniş açı})$$




5. İki dış açıortayın kesişmesiyle oluşan açının ölçüsü

$$y = 90^\circ - \frac{m(\widehat{A})}{2} \quad (\widehat{BDC} : \text{dar açı})$$




6. Bir iç açıortay ile bir dış açıortayın kesişmesiyle oluşan açının ölçüsü

$$z = \frac{m(\widehat{A})}{2}$$



7. Üçgenin bir kenarı içe büküldüğünde oluşan açının ölçüsü $x = a + b + c$




ceBİRSİl.com

ÜÇGENDE AÇI-KENAR BAĞINTILARI

1. Bir üçgende açılar arasındaki sıralama ile bu açılar karşısındaki kenarlar arasındaki sıralama doğru orantılıdır.

$m(\widehat{A}) \geq m(\widehat{B}) \geq m(\widehat{C})$ ise $a \geq b \geq c$ dir.



2. Bir üçgende herhangi bir kenarın uzunluğu, diğer iki kenarın uzunluğunun farkının mutlak değerinden büyük toplamlarından ise küçüktür.

$$|b - c| < a < b + c$$

$$|a - c| < b < a + c$$

$$|a - b| < c < a + b$$

3. ABC üçgeninde

$$m(\widehat{B}) > 90^\circ \text{ ise}$$

$$m(\widehat{B}) < 90^\circ \text{ ise}$$


$$b^2 > a^2 + c^2 \text{ dir.}$$

$$b^2 < a^2 + c^2 \text{ dir.}$$

4. Bir üçgenin sınırladığı alan içindeki herhangi bir nokta ile köşeler birleştirildiğinde;

ABC üçgeninin çevresi verilirse ve çevreye $2u$ denirse

$$u < |PA| + |PB| + |PC| < 2u \text{ dur.}$$




ceBİRSİl.com


DİK ÜÇGEN

PİSAGOR BAĞINTISI


ABC dik üçgeninde [AC] kenarına **hipotenüs** denir ve $b^2 = a^2 + c^2$ dir.



Bir dik üçgende hipotenüse çizilen kenarortayın uzunluğu hipotenüs uzunluğunun yarısıdır.



ÖKLİD BAĞINTILARI



i) $h^2 = p \cdot k$

ii) $b^2 = k \cdot a$

iii) $c^2 = p \cdot a$

iv) $A(\triangle ABC) = \frac{b \cdot c}{2} = \frac{a \cdot h}{2}$


olduğundan $a \cdot h = b \cdot c$ dir.

İKİZKENAR ÜÇGEN

1. İki kenar uzunluğu eşit olan üçgenlere **ikizkenar üçgen** denir. Diğer kenara **taban** denir.


[BC]: Taban, \hat{B} ve \hat{C} : Taban açıları,
 \hat{A} : Tepe açısı

$$|AB| = |AC| \Leftrightarrow m(\hat{B}) = m(\hat{C})$$




2. A, B ve H noktaları doğrusal, F, B ve C noktaları doğrusal, $[FH] \perp [HB]$

$|AB| = |AC|$ ise $|FE| - |FH| = h_b = h_c$ dir.




3. P herhangi bir nokta,

$[PR] \parallel [AB]$, $[PS] \parallel [AC]$ ve $|AB| = |AC|$ olmak üzere $|PR| + |PS| = |AB| = |AC|$




EŞKENAR ÜÇGEN

1. Üç kenar uzunluğu da birbirine eşit olan üçgendir. İç açıları eşit ve 60°'dir.



2. Eşkenar üçgende yükseklik hem açıortay hem de kenarortaydır.


$$(h_a = h_b = h_c = V_a = V_b = V_c = n_A = n_B = n_C)$$



3. Eşkenar üçgenin üzerinden veya içinden alınan herhangi bir noktadan kenarlara çizilen dikmelerin toplamı, eşkenar üçgenin yüksekliğine eşittir.


ABC eşkenar üçgen, $|AH| = h$

P, herhangi bir nokta $|PD| + |PF| + |PE| = h$



4. Eşkenar üçgenin içinden alınan herhangi bir noktadan kenarlara çizilen paralellerin toplamı, eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğuna eşittir.


ABC eşkenar üçgen, P herhangi bir nokta ise $|PR| + |PS| + |PT| = a$



ceBİRSİEL.com

ÜÇGENDE AÇIORTAY BAĞINTILARI

1. ABC üçgeninde $[AN]$, iç açıortay olmak üzere (n_A)



$$\frac{|AB|}{|AC|} = \frac{|BN|}{|CN|} = \frac{A(\triangle ABN)}{A(\triangle ANC)}$$


$$\text{ve } |AN|^2 = |AB| \cdot |AC| - |BN| \cdot |CN|$$

2. ABC üçgeninde $[AN']$ dış açıortay olmak üzere;

$$\frac{|AC|}{|AB|} = \frac{|N'C|}{|N'B|}$$


$$|AN'|^2 = |N'C| \cdot |N'B| - |AC| \cdot |AB|$$

şeklindedir.




3. Bir üçgende iki dış açıortayı ile bir iç açıortayı bir noktada kesişir. Bu nokta üçgenin dış teğet çemberlerinden birinin merkezidir. O, ABC üçgeninin dış teğet çemberlerinden birinin merkezidir.

4. D, ABC nin iç teğet çemberinin merkezi ise,
 $\frac{A(CDB)}{a} = \frac{A(ADC)}{b} = \frac{A(ABD)}{c}$ dir.



ÜÇGENDE KENARORTAY BAĞINTILARI

1. Kenarortaylar bir noktada kesişirler. Bu nokta üçgenin ağırlık merkezidir.




G, ağırlık merkezi olmak üzere;


$$|AG| = 2 \cdot |GF|, |BG| = 2 \cdot |GE| \text{ ve}$$

$$|CG| = 2 \cdot |GF| \text{ dir.}$$


Kenarortay teoremi, $2 \cdot V_a^2 + \frac{a^2}{2} = b^2 + c^2$




2. [AD] kenarortay, [AH] yükseklik,
 $|HD| = x$ ise $2 \cdot a \cdot x = |b^2 - c^2|$ dir.



3. G, ABC üçgeninin ağırlık merkezi ve
 $m(\widehat{BAC}) = 90^\circ$ ise $5 \cdot V_a^2 = V_b^2 + V_c^2$




4. $[BD] \perp [CE] \Rightarrow V_a^2 = V_b^2 + V_c^2$



ÜÇGENDE ALAN

Yükseklik: Bir üçgende herhangi bir köşeden karşı-
 sındaki kenara (veya kenarın uzantısına) indirilen dikmeye denir.

$$A(\triangle ABC) = \frac{a \cdot h_a}{2} = \frac{b \cdot h_b}{2} = \frac{c \cdot h_c}{2}$$




Herhangi İki Kenarı ve Bu İki Kenar Arasındaki Açısı Verilen Üçgenin Alanı


$$A(\triangle ABC) = \frac{1}{2} b \cdot c \sin(\widehat{A})$$

$$A(\triangle ABC) = \frac{1}{2} a \cdot c \sin(\widehat{B})$$

$$A(\triangle ABC) = \frac{1}{2} a \cdot b \sin(\widehat{C})$$



Üç Kenar Uzunluğu Verilen Üçgenin Alanı



ABC üçgeninin çevresi

$$Ç(\triangle ABC) = a + b + c \text{ olmak üzere;}$$

$$u = \frac{a+b+c}{2} = \frac{Ç(\triangle ABC)}{2}$$


$$A(\triangle ABC) = \sqrt{u \cdot (u - a) \cdot (u - b) \cdot (u - c)}$$

şeklinde dir.

Çevresi ve İç Teğet Çemberinin Yarıçapı Verilen Üçgenin Alanı

O, iç teğet çemberinin merkezi; r, çemberin yarı-
 çapı ve $u = \frac{a+b+c}{2}$ olmak üzere


$$A(\triangle ABC) = u \cdot r \text{ şeklindedir.}$$



Çevrel Çemberinin Yarıçapı ve Kenar Uzunlukları Verilen Üçgenin Alanı

$IOCI=R$ (çevrel çemberin yarıçapı)

$$A(\triangle ABC) = \frac{a \cdot b \cdot c}{4R} \text{ şeklindedir.}$$



ceBİRSEL.com

ÜÇGENDE ALAN İLE İLGİLİ BAZI ÖZEL DURUMLAR

1. Yükseklikleri eşit olan üçgenlerin alanları oranı ile tabanları oranı eşittir.


$d_1 \parallel d_2$ ise h , ABC ve DEF üçgenlerinin ortak yüksekliğidir.

$$\frac{A(\triangle ABC)}{A(\triangle DEF)} = \frac{\frac{a \cdot h}{2}}{\frac{d \cdot h}{2}} = \frac{a}{d}$$


2. Taban uzunlukları eşit olan üçgenlerin alanları oranı, (eşit olan tabanlara ait) yüksekliklerinin oranına eşittir.

$$a = d \text{ ise } \frac{A(\triangle ABC)}{A(\triangle DEF)} = \frac{\frac{a \cdot h_a}{2}}{\frac{d \cdot h_d}{2}} = \frac{h_a}{h_d} \text{ olur.}$$

3. $\frac{A(\triangle ABC)}{A(\triangle DEF)} = \frac{|ABI| \cdot |ACI| \cdot |BCI|}{a \cdot c \cdot e + b \cdot d \cdot f}$ şeklindedir.



BENZERLİK ORANI VE BENZER ÜÇGENLERİN ALANLARI ORANI



$\triangle ABC \sim \triangle DEF$ dir.

$$\frac{|ABI|}{|IDEI|} = \frac{|BCI|}{|EFI|} = \frac{|ACI|}{|DFI|} = k \text{ oranına benzerlik oranı denir.}$$

Benzerlik oranı:

$$\frac{|ABI|}{|IDEI|} = \frac{|BCI|}{|EFI|} = \frac{|ACI|}{|DFI|} = \frac{h_a}{h_d} = \frac{h_b}{h_e} = \frac{h_c}{h_f} = k$$


$$\frac{n_A}{n_D} = \frac{n_B}{n_E} = \frac{n_C}{n_F} = \frac{V_a}{V_d} = \frac{V_b}{V_e} = \frac{V_c}{V_f} = \frac{Q(\triangle ABC)}{Q(\triangle DEF)} = k$$

$$\text{ve } \frac{A(\triangle ABC)}{A(\triangle DEF)} = k^2$$

TEMEL BENZERLİK TEOREMİ

ABC üçgeninde $[ED] \parallel [BC]$

$$\frac{|AEI|}{|ABI|} = \frac{|ADI|}{|ACI|} = \frac{|EDI|}{|BCI|}$$



temel benzerlik teoremi denir.

THALES (TALES) TEOREMİ


- I) $[AD] \parallel [BE] \parallel [CF]$ olmak üzere

$$\frac{|ABI|}{|BCI|} = \frac{|IDEI|}{|EFI|} \text{ ve } \frac{|ABI|}{|ACI|} = \frac{|IDEI|}{|DFI|} \text{ şeklindedir.}$$



- II) $[AC] \parallel [DE]$ olmak üzere


$$\frac{|ABI|}{|BEI|} = \frac{|CBI|}{|BDI|} = \frac{|ACI|}{|DEI|} \text{ şeklindedir.}$$



MENELAUS TEOREMİ

Şekildeki ABC üçgeninin BC kenarının uzantısı ile, [AB] ve [AC] 'nı kesen d doğrusu verildiğinde;


$$\frac{|PCI|}{|PBI|} \cdot \frac{|BSI|}{|IASI|} \cdot \frac{|ARI|}{|ICRI|} = 1 \text{ olur.}$$



SEVA TEOREMİ

Şekildeki ABC üçgeninde,


$$\frac{|ASI|}{|BSI|} \cdot \frac{|BTI|}{|CTI|} \cdot \frac{|CRTI|}{|ARTI|} = 1 \text{ şeklindedir.}$$



STEWART TEOREMİ

Şekildeki ABC üçgeninde a, b ve c kenar uzunlukları, P, [BC] nın üzerinden alınan herhangi bir nokta olmak üzere;


$$x^2 = \frac{b^2 \cdot m + c^2 \cdot n}{a} - m \cdot n \text{ şeklindedir.}$$



CARNOT TEOREMİ

P, herhangi bir nokta olmak üzere;

$$a^2 + c^2 + e^2 = b^2 + d^2 + f^2 \text{ şeklindedir.}$$



ÇOKGENLER

Konveks Çokgenin Özellikleri

n kenarlı bir konveks çokgenin:

1. İç açılarının ölçülerinin toplamı: $(n - 2) \cdot 180^\circ$ dir.
2. Dış açılarının ölçüleri toplamı 360° dir.
3. Bir köşesinden çizilen köşegenlerle çokgen, $(n - 2)$ tane üçgene ayrılır.
4. Bir köşesinden çizilen tüm köşegenlerin sayısı, $(n - 3)$ tür.
5. Bir çokgenin tüm köşegenlerinin sayısı: $\frac{n(n-3)}{2}$ dir.
6. Kenar sayısı n olan bir konveks çokgenin çizilebilmesi için $(2n - 3)$ tane elemanı bilinmelidir. Bu elemanların en az $(n - 2)$ tanesi uzunluk, en çok $(n - 1)$ tanesi açı olmalıdır.

DÜZGÜN ÇOKGENLER


Kenarları eşit uzunlukta ve iç açılarının ölçüleri eşit olan çokgene **düzgün çokgen** denir.

Düzgün Çokgenin Özellikleri

1. n kenarlı bir düzgün çokgenin bir dış açısının ölçüsü: $\frac{360^\circ}{n}$ dir.
2. n kenarlı bir düzgün çokgenin bir iç açısının ölçüsü: $\frac{(n - 2) \cdot 180^\circ}{n}$ veya $180^\circ - \frac{360^\circ}{n}$ dir.


Düzgün Çokgenin Alanı

1. Bir kenarının uzunluğu a, iç teğet çemberinin yarıçapı r olan n kenarlı düzgün çokgenin alanı $A = \frac{n \cdot a \cdot r}{2}$ dir.



2. Çevrel çemberinin yarıçapı R olan n kenarlı düzgün çokgenin alanı


$$A = \frac{1}{2} \cdot n \cdot R^2 \cdot \sin \alpha \quad (\alpha = \frac{360^\circ}{n}) \text{ dir.}$$



DÖRTGENLER

Konveks Dörtgenlerin Genel Özellikleri


1. İç açılarının ölçüleri toplamı 360° dir.
2. $A(ABCD) = \frac{1}{2} \cdot |AC| \cdot |BD| \cdot \sin \alpha$ dir.



3. Köşegenleri dik kesişen bir dörtgende


$$(i) a^2 + c^2 = b^2 + d^2$$

$$(ii) A(ABCD) = \frac{|AC| \cdot |BD|}{2}$$



4. [AC] ve [BD] köşegendir.

$$S_1 \cdot S_3 = S_2 \cdot S_4 \text{ tür.}$$




PARALELKENAR


Karşılıklı kenarları paralel ve eşit olan dörtgene **paralelkenar** denir. Paralelkenarın karşılıklı açıları eşittir.

$[AB] \parallel [DC]$ ve $[AD] \parallel [BC]$ dir.

$\alpha + \theta = 180^\circ$ olur.




1. Köşegenleri, birbirlerini eşit iki parçaya bölerler. Alan dört eşit parçaya bölünür. E noktası paralelkenarın ağırlık merkezi veya simetri merkezidir.



2. Paralelkenarın a kenarına ait yüksekliği h_a ve b kenarına ait yüksekliği h_b olsun.


$h_a \neq h_b$ dir. Paralelkenarın alanı;

$$A(ABCD) = a \cdot h_a = b \cdot h_b$$




3. Paralelkenarın kenar uzunlukları ile bir açısı veriliyor ise alanı;

$$A(ABCD) = a \cdot b \sin \alpha = a \cdot b \cdot \sin \theta$$




4. K, paralelkenarın üzerinde herhangi bir nokta ise $A(BKC) = S_1 + S_2$ ve


$$A(ABCD) = 2 \cdot A(BKC) \text{ dir.}$$



5. P, paralelkenarın içerisinde herhangi bir nokta ise $S_1 + S_3 = S_2 + S_4$




6. B, H, F, E noktaları ve E, D, C noktaları doğrusal ise $|BH|^2 = |HF| \cdot |HE|$



7. $A(ABCD) = S$ ise $A(\triangle BEF) = \frac{3}{8} \cdot S$

$$A(\triangle ABE) = A(\triangle BCF) = \frac{1}{4} \cdot S$$


$$A(\triangle DEF) = \frac{1}{8} \cdot S \text{ olur.}$$




DİKDÖRTGEN

Köşe açılarının ölçüleri 90° dir. Karşılıklı kenarları ve köşegen uzunlukları eşittir.

1. Köşegenler alanı dört eşit parçaya böler. Köşegenler birbirini ortalar.




2. Dikdörtgenin çevresi, $\Ç(ABCD) = 2 \cdot (a + b)$
Dikdörtgenin alanı, $A(ABCD) = a \cdot b$



3. P, dikdörtgenle düzlemsel herhangi bir nokta olmak üzere P'yi köşelerle birleştirdiğimizde;


$$|AP|^2 + |CP|^2 = |BP|^2 + |DP|^2 \text{ ve}$$

$$A(\triangle APD) + A(\triangle BPC) = A(\triangle APB) + A(\triangle CPD) \text{ şeklindedir.}$$



4. P, dikdörtgenin dışında ve dikdörtgenle düzlemsel herhangi bir nokta olmak üzere P'yi köşelerle birleştirdiğimizde;

$$|AP|^2 + |CP|^2 = |BP|^2 + |DP|^2 \text{ şeklindedir.}$$




ceBİRSİl.com
KARE

Köşegenleri dik kesişen ve köşegenleri açıortay olan dikdörtgene **kare** denir.

Dikdörtgenin özellikleri kare için de geçerlidir.

ABCD karesinde $|AC| = |BD| = a\sqrt{2}$ dir.

$$A(ABCD) = a \cdot a = a^2 \text{ ve } A(ABCD) = \frac{|AC| \cdot |BD|}{2}$$




DELTOİD

Taban uzunlukları ortak iki ikizkenar üçgenden oluşan şekle **deltoid** denir. Tepe açılarını birleştiren köşegen açıortaydır. Ayrıca diğer köşegenin uzunluğunu dik ortalar.

$$m(\widehat{ADC}) = m(\widehat{ABC}) \text{ ve}$$

$$A(ABCD) = \frac{|AC| \cdot |BD|}{2}$$




ceBİRSİl.com
YAMUK

İki kenarı birbirine paralel olan dörtgene **yamuk** denir.

Paralel olan kenarlara **yamuğun tabanları**, diğer kenarlara yamuğun **yan kenarları** denir. [AD] nın orta noktası E, [BC] nın orta noktası F ise [EF] na **orta taban** denir ve


$$[EF] \parallel [AB] \parallel [CD] \text{ dir.}$$



Özellikler


1. $[AB] \parallel [DC]$,

$$m(\widehat{A}) + m(\widehat{D}) = m(\widehat{B}) + m(\widehat{C}) = 180^\circ \text{ dir.}$$



2. [EF] orta taban,

$$|AB| = a, |CD| = c \text{ ise } |EF| = \frac{a+c}{2} \text{ dir.}$$




3. ABCD yamuğunda [AC] ve [DB] köşegen

$$A(\triangle KAD) = S_1, A(\triangle KAB) = S_2,$$

$$A(\triangle KBC) = S_3, A(\triangle KCD) = S_4 \text{ ise}$$

$$S_1 = S_3 \text{ ve } S_1 = \sqrt{S_2 \cdot S_4} \text{ tür.}$$

$$A(ABCD) = (\sqrt{S_2} + \sqrt{S_4})^2 \text{ dir.}$$



YAMUĞUN ALANI

ABCD yamuk, $[KH] \perp [AD]$,


$$|AB| = a, |DC| = c, |KH| = h \text{ ise}$$

$$\text{Alan } (ABCD) = \left(\frac{a+c}{2} \right) \cdot h$$

- ABCD yamuk,

$$|KC| = |KB| \text{ ise } A(\triangle AKD) = \frac{A(ABCD)}{2} \text{ ve}$$


$$A(ABCD) = |KH| \cdot |AD| \text{ dir.}$$



- ABCD yamuk, $[EF] \parallel [AB]$,


$$|EF| = x, A(EDCF) = S_1, A(AEFB) = S_2$$

$$\text{ve } S_1 = S_2 \text{ ise } x = \sqrt{\frac{a^2 + c^2}{2}} \text{ dir.}$$



İKİZKENAR YAMUK

Paralel olmayan kenarları eşit uzunlukta olan yamuğa **ikizkenar yamuk** denir.




Özellikler


1. Taban açıları eşittir. $m(\widehat{A}) = m(\widehat{B}) = \alpha$,
 $m(\widehat{C}) = m(\widehat{D}) = \beta$ dir.

2. Köşegenleri eşit uzunluktadır.

3. $[DH] \perp [AB]$, $[CK] \perp [AB]$
 $|AH| = |KB| = \left| \frac{a-c}{2} \right|$




4. ABCD ikizkenar yamuk, $[AC] \perp [BD]$ ve yamuğun yüksekliği h ise
 $h = \frac{a+c}{2}$ ve $A(ABCD) = h^2$ dir.




ceBİRSEL.com
DİK YAMUK

Yan kenarlarından biri tabanlara dik olan yamuğa **dik yamuk** denir.



• Bir dik yamukta köşegenler dik kesişiyorsa $h = \sqrt{a \cdot c}$ dir.




ÇEMBER

Teğet: Çember ile bir ortak noktası olan doğruya **teğet** denir.

Kesen: Çember ile iki ortak noktası olan doğruya **kesen** denir.

Kiriş: İki ucu da çember üzerinde olan doğru parçasına **kiriş** denir. Merkezden geçen kirişe **çap** denir. En büyük kiriş çaptır.

Yay: Çember üzerindeki iki nokta arasında kalan parçaya yay denir.



AB yayı, \widehat{AB} şeklinde gösterilir.


AB yayının ölçüsü ise $m(\widehat{AB})$ şeklinde gösterilir.

ÇEMBERDE AÇI, TEĞET, KİRİŞ, KESEN ÖZELLİKLERİ

1. Merkez Açı

İki yarıçapın oluşturduğu açıya **merkez açı** denir.

Merkez açının ölçüsü gördüğü yayın ölçüsüne eşittir.




$$m(\widehat{AB}) = m(\widehat{AOB}) = \alpha$$

2. Çevre Açısı

Bir ucu ortak olan iki kiriş arasındaki açıya **çevre açısı** denir.

Çevre açısı gördüğü yayın yarısına eşittir.




$$m(\widehat{AC}) = 2 \cdot m(\widehat{ABC}) = 2\alpha$$

3. Teğet - Kiriş Açısı

Çember üzerinde teğet ile kirişin oluşturduğu açıya **teğet - kiriş açısı** denir.


Teğet - kiriş açının ölçüsü gördüğü yayın yarısına eşittir.



$$m(\widehat{BC}) = 2 \cdot m(\widehat{ABC}) = 2\alpha$$


4. Çapı Gören Çevre Açısı

Çapı gören çevre açının ölçüsü 90° dir.




5. Merkezle teğetin değme noktasını birleştiren yarıçap, teğete diktir.

T, teğet noktası ise $d \perp [TO]$



6. Çemberin sınırladığı alan içerisinde kesişen iki kirişin oluşturduğu açı


$$\alpha = \frac{m(\widehat{AB}) + m(\widehat{CD})}{2} = \frac{a+b}{2}$$



7. Çemberin sınırladığı alan dışında kesişen iki kesenin oluşturduğu açı


$$m(\widehat{BPC}) = \frac{m(\widehat{BC}) - m(\widehat{AD})}{2}$$

$$\alpha = \frac{x-y}{2} \text{ şeklindedir.}$$




ÇEMBERDE UZUNLUK

1. Çembere dışındaki bir P noktasından iki tane teğet çizilirse bu uzunlukları birbirine eşittir.



[PA ve [PB teğet $|PA| = |PB|$ şeklindedir.

2. Çemberin dışındaki bir noktadan çembere sonsuz sayıda kesen çizilir.




Bu kesenler arasındaki bağıntı;

P, çemberin dışındaki bir nokta olduğuna göre

$$|PA| \cdot |PB| = |PC| \cdot |PD| = |PE| \cdot |PF| = \dots \text{ şeklindedir.}$$

3. Noktanın çembere göre kuvveti alındığında; A, teğet noktası olmak üzere $|PA|^2 = |PB| \cdot |PC| = |PD| \cdot |PE|$ şeklindedir.




4. Çemberin içindeki bir P noktasından sonsuz sayıda kiriş çizilir. P noktasının bu kirişlerden ayırdığı parçaların uzunlukları çarpımı eşittir.

$$|PA| \cdot |PE| = |PB| \cdot |PF| = |PC| \cdot |PH| = |PD| \cdot |PK| = \dots \text{ şeklindedir.}$$


P noktasının çembere göre kuvveti;

$$\text{Kuvvet} = |PA| \cdot |PE| = |PB| \cdot |PF| = \dots \text{ şeklindedir.}$$




5. Merkezden, uzunlukları eşit olan kirişlere çizilen dikmelerin uzunlukları birbirine eşittir.

$$|AB| = |CD| \text{ ise } |AH_1| = |BH_1| = |CH_2| = |DH_2| \text{ ve } |OH_1| = |OH_2| \text{ şeklindedir.}$$



6. • $[AB] \parallel [CD]$ ise $|\widehat{AC}| = |\widehat{BD}|$ dir.
• $|AB| = |CD|$ ise $|\widehat{AB}| = |\widehat{CD}|$



ceBİRSEl.com

DAİRENİN ALANI VE ÇEVRESİ

1. Bir çember ve çemberin iç bölgesini oluşturan noktaların kümesinin oluşturduğu şekle **daire** denir. Dairenin alanı $= \pi \cdot r^2$

$$A(\text{AOB})_{\text{Daire dilimi}} = \frac{\pi \cdot r^2 \cdot \alpha}{360^\circ} = \frac{|\widehat{AB}| \cdot r}{2}$$

2. Çemberin çevre uzunluğu $= 2 \cdot \pi \cdot r$, AB yayının uzunluğu $|\widehat{AB}| = \frac{2 \cdot \pi \cdot r \cdot \alpha}{360^\circ}$ şeklindedir.